

Infektiöse Erkrankungen bei Katzen III**Panleukopenie (Katzenseuche)**

- Erreger: felines Parvovirus (FPV)
- Übertragung durch Kontakt mit erregerhaltigem Kot oder verschmutzten Gegenständen
- Symptome: Erbrechen und blutiger Durchfall, Austrocknung, Apathie, Herz-Kreislauf-Symptome, Atemnot. Bei trächtigen Katzen Abort, bei Welpen Unterentwicklung des Gehirns
- Tierärztliche Behandlung überlebensnotwendig
- Prophylaxe: Impfung empfehlenswert (Bestandteil von Kombinationsimpfstoffen)

Toxoplasmose

- Erreger: *Toxoplasma gondii*
- Übertragung durch Aufnahme von erregerhaltigem (Zysten) Fleisch oder durch Katzenkot mit Oozysten (Erregereier)
- Gefahr der Infektion des Menschen (=Zwischenwirt) über Katzenkot (z.B. bei der Gartenarbeit über kotverschmutzte Erde)! Befall fast aller Organe; Schwangere sind stark gefährdet, Missbildungen des Kindes möglich!
- Symptome: bei Katzen im Allgemeinen keine
- Bei Nachweis der Erreger im Katzenkot Behandlung empfehlenswert, um die Übertragung auf den Menschen, insbesondere auf schwangere Frauen, zu verhindern