



Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Unie in het kader van het Communautaire Initiatief INTERREG-IIIA met middelen van het Europees Structurfonds voor Regionale Ontwikkeling alsmede het Ministerie van Economische Zaken van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Das Projekt wird finanziell unterstützt durch die Europäische Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG-IIIA aus Mitteln des Europäischen Strukturfonds für regionale Entwicklung sowie durch das Wirtschaftsministerium des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen.



Ce sunt MRSA ?

Staphylococcus aureus sunt bacterii care se gasesc in mod normal pe mucoasa nazala din partea exterioara a acestuia iar in cazuri mai putin intalnite acestea se gasesc pe suprafata pielii al fiecaruia din trei cazuri. In mod normal aceste bacterii nu cauzeaza infectii. In cazul unei lezuni a pielii cauzate de exemplu in timpul unei operatii *S. aureus* poate insa cauza infectii alle ranilor. Asemenea infectii pot disparea pur si simplu (abces, formare de puroi), in cazul insa a sistemelor de aparare imunitare care sunt slabite, infectiile pot cauza forme mai grave cum ar fi septicemie si pneumonie. In cazul unei Infectii pentru a elimina bacteriile este necesara intrebuintarea antibioticilor. O parte din *Staphylococcus aureus* sunt rezistente la antibiotici precum „Methicillin” si in mare masura la toti ceilalți antibiotici existenti. Asemenea Methicillin rezistente *Staphylococcus aureus*, sunt denumiti prescurtat MRSA.

Exista factori de risc, de a deveni purtatori de MRSA?

Da. MRSA se poate cuibari in mod special usor pe piele si pe mucoasa unui unei persoane atunci cand factorii de risc pentru raspandirea MRSA sunt existenti.

Acesti factori sunt dupa cum urmeaza:

- o anamnezie pozitiva a MRSA, aceasta ar insemana luarea in calcul al persoanei purtatoare chiar si dupa prima tratare reusita a purtatorului MRSA.
- pastrarea contactului cu persoana in cauza purtatoare de MRSA.
- internarea in spital (>24 h) in termenul ultimelor 6 luni (Exceptie: in conditiile in care spitalul este cunoscut ca nefiind nepurtator de MRSA).
- internarea intrun azil de batrani (>24 h) in termenul ultimelor 6 luni (Exceptie: unitatea medicala respectiva este cunoscuta ca nefiind purtatoare de MRSA).
- internarea in spital in strainatate (cu exceptia spitalelor din Olanda si tarile scandinave).
- tratarea medicamentoasa cu ajutorul antibioticilor in termenul ultimelor 6 luni.
- necesitatea ingrijirii cronice constante, obligativitatea dializei, cateter.
- rani cronice deschise, infectii profunde ale partilor moi sau Ulcer.

La preexistenta unuia dintre acesti factori enumerati sau a mai multora dintre acestia este necesara o analiza medicala a preexistentei unui virus - MRSA asupra persoanei purtatoare inaintea internarii sau in timpul acestia.

Ce fel de masuri trebuie luate in cazul unui pacient (suspect de MRSA)?

- Ca pacient MRSA veti fi internat in regim de izolare intro camera de spital sau impreuna cu mai multi purtatori MRSA, pentru a inlatura orice risc de raspandire a virusului MRSA la persoane nepurtatoare. In caz ideal se recomanda o incaperi cu hol, aceasta avind posibilitatea de a forma o a doua incaperi (cu functie de filtrare) inainte de intrarea in camera bolnavului in spate a bolnavilor MRSA. Acest hol ar putea fi delimitat de camera bolnavului, bolnavilor cu ajutorul usilor.
- Personalul medical va fi protejat prin purtarea halatelor corespunzatoare, protectia gurii si a nasului. Inaintea parasirii de catre personalul medical cat si a pacientului al camerei cu pricina, respectiv al holului, se va face o dezinfecție a mainilor. Inbracamintea de protectie corespunzatoare se va dezbraca inainte de iesire.
- Deasemenea vizitorii vor avea aceleasi indatoriri, sa poarte inbracamintea de protectie si sa-si dezinfecțeze mainile la iesirea din camera.
- In acest caz va veti supune unei terapii de dezinfecție care va fi realizata in stransa colaborare cu medicul dumneavoastra.
- Se vor lua de la dumneavoastra probe din nas, amigdale, din regiunea anala si din rani. Acestea vor fi trimise la analiza in laboratoare. In conditiile in care dupa aceste probe luate de la dumneavoastra in mod repetat (de trei ori) nu se vor mai gasi MRSA, veti fi inregistrat ca MRSA-negativ asadar ca nepurtator MRSA, in cazul acesta masurile speciale de igiena si preventie nu vi se vor mai aplica.

- Va rugam insa sa va ganditi la controlul periodic de circa 2-3 ori pe an in vederea stabilirii de perioana neputatoare de MRSA (MRSA-negativ).
- Amintiti la fiecare consultare medicala si internare faptul ca ati fost purtator de MRSA (MRSA-positiv), pentru a se putea infirma in spate confirma existenta virusului MRSA. Aceasta constatare este necesara pentru protejarea sanatatii dumneavostra.
- Acestea sunt cele mai importante masuri. Alte masuri de protectie va vor fi oferite de cadrul personalul institutiei medicale in spate de asistente si doctorii acestora.
- Pentru alte informatii importante va puteti adresa si centrului MRSA - Helpdesk din regiunea germana Münsterland la institutul pentru igiena a clinicii universitatare Münster la numarul de telefon (0251) 8352317 sau in internet <http://mrsa-net.org> sau info@mrsa-net.org.

Ce inseamna „MRSA - pacient de contact” ?

MRSA-pacient de contact inseamna ca dumneavaostra inpartiti camera (sau ati impartit-o) cu un purtator de MRSA si prin urmare exista posibilitatea ca si dumneavaostra sa fiti infectat cu acest virus. Pentru a infirma sau confirma prezenta virusului trebuie sa vi se faca analiza medicala a probelor pentru MRSA. La fiecare prezenta a dumneavaostra la medic trebuie sa specificati ca ati avut contact cu un pacient infectat cu acest virus MRSA pentru ca inpinzirea acestuia la dumneavaostra sa se poata depista dar si in scopul protejarii medicale a dum-neavostra cat si a concetenilor dumneavaostra de MRSA.

Cum se trasmit MRSA si cum se poate evita molipsirea?

Asa cum am precizat si mai sus molipsirea MRSA se face cu preponderenta in incinta spitalelor. Molipsirea se face in cele mai multe cazuri prin contact si in cazuri mai rare prin stropi, este exclusa raspandirea pe calea aerului. Ca masura importanta de a evita molipsirea este important sa stim daca o persoana este partatoarea acestui virus MRSA sau nu. Pentru aceasta sunt necesare efectuarea analizelor medicale.

In mod suplimentar vor fi luate numai in spitale astfel de masuri preventive (prin halate, protectie gura, manusi, protectia parului capilar, cu scopul de a minimaliza pericolul molipsirii altor pacienti cu acst virus MRSA). Toate aceste masuri de protectie nu sunt necesare in aziluri de batrani, cabinele medicale, salvari, cu atat mai putin la locuinta personala. Corespunzator activitatii de la caz la caz sunt suficiente folosirea standardului de igiena (inlaturarea contactului cu rani deschise, succesiunea tratamentului sau a activitatilor, igiena mainilor etc.)

In ce consta dezinfecția?

Asa numita dezinfecție sau terapia de dezinfecție serveste eliminarii bacteriilor MRSA de pe piele si de pe mucoasa purtatorului. La oameni sanatosi MRSA se poate inlatura fara probleme ca rezervor principal din zona prenazala. Aici vor fi folositi antibiotici sau antiseptice unguente nasale. In decursul catorva zile aceste bacterii MRSA sunt eliminate iar succesul dezinfecției se va materializa in rezultatele analizelor finale. Procentul succesului acestor simpe dezinfecții este foarte mare si durabil. In cazul in care sunt existenti factori de dezinfecție precum (Rani, cateter etc.) trebuie intai asteptata vindecarea acestora respectiv incetarea acestor factori ca apoi sa se treaca la propriuzisa dezinfecție MRSA. Totusi se poate recomanda in aceasta faza a dezinfecției o terapie care duce la diminuarea microbilor.

Este periculoasa sederea unui pacient in aceiasi camera cu pacientul MRSA?

Pentru clarificare trebuie precizat ca pentru orice persoana sanatoasa riscul unei molipsiri a infectiei MRSA este foarte mic.

Cu siguranta ramane insa ca si la orice infectie si un rest de risc medical. Atata timp cat familia si vizitatorii sunt sanatosi, nu dauneaza niciunua dintre acestia prezenta in camera cu pacientul - MRSA. Contactul normal cum ar fi de exemplu strangerea de mana si inbratisarile sunt posibile. Dupa aceasta se recomanda insa, in orice caz, spalarea mainilor si dezinfecțarea acestora.

Eu am MRSA si voi fi curind dezinternat. Ce trebuie sa fac ca sa-mi protezej familia de MRSA?

In cazul in care nu sa inceput dezinfecțarea, ar trebui ca aceasta sa se faca mai intai cu acordul medicului de familie. In cazul in care suntem cu virusul MRSA infectat, ar trebui sa respectati urmatoarele masuri pentru a in piedica o posibila raspandire a MRSA in familia dumneavostra.

- Urmăriți o bună igienă personală.
- Amintiti la fiecare vizita medicală sau internare personalului medical (asistente sau doctori) ca ati fost purtator de acest virus MRSA, in acest fel pot fi intrebuitate anumite masuri de protectie si inceperea terapiei de dezinfecție.